



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Iechyd Cyhoeddus
Cymru
Public Health
Wales

Y Rhaglen Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd, Ymwrthedd Gwrthficrobaidd a Rhagnodi

Ymwrthedd Gwrthficrobaidd mewn Coliformau Wrinol yng Nghymru 2016-2022



Fersiwn 1

Cyhoeddwyd: 04/07/2023

Gellir gweld y Rhaglen Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd, Ymwrthedd i Wrthfotigau a Rhagnodi (HARP) drwy fynd i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn:
<https://icc.gig.cymru/>

Cyhoeddwyd gan Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru, Rhif 2 Cwr y Ddinas, Stryd Tyndall, Caerdydd CF10 4BZ

Cyhoeddwyd 4 Gorffennaf 2023, Fersiwn 1

Diolchiadau

Mieko Yasunishi (Gwybodeg PHW), Dr Lim Jones a Dr Mandy Wootton (SACU, PHW)

Awduron yr Adroddiad

Maggie Heginbotham, Siân Boots, Daryn Sutton, Meryl Davies a Robin Howe ar ran Rhaglen HARP

Cyfeiriwch at y ddogfen hon fel:

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru: Ymwrthedd Gwrthfacterol mewn Meithriniadau Gwaed yng Nghymru 2016-2022

Dylid cyfeirio ceisiadau am ddata ac ymholiadau at:

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rhaglen HARP

4ydd Llawr, Rhif 2 Cwr y Ddinas

Stryd Tyndall

Caerdydd CF10 4BZ

E-bost: harp@wales.nhs.uk

Cynnwys

Diolchiadau	1
Awduron yr Adroddiad	1
Cyfeiriwch at y ddogfen hon fel:	1
Dylid cyfeirio ceisiadau am ddata ac ymholiadau at:	1
Cynnwys	2
Cyflwyniad	3
Pwyntiau Allweddol o Ddiddordeb	3
Methodoleg	4
Data ar ymwrthedd	4
Ffynonellau Data	4
Grwpiau Gwrthficrobaidd	4
Organebau	4
<i>Escherichia coli</i>	5
<i>E. coli</i> o samplau wrin cleifion mewnol (n = 9,784 yn 2022).....	5
<i>E. coli</i> o samplau wrin cleifion allanol (n = 3,808 yn 2022)	7
<i>E. coli</i> o samplau wrin cymunedol (n = 58,407 yn 2022)	9
Coliformau nad ydynt yn gysylltiedig ag <i>Escherichia coli</i>	11
Dim-ECOL o samplau wrin cleifion mewnol (n = 5,438 yn 2022).....	11
Dim-ECOL o samplau wrin cleifion allanol (n = 1,838 yn 2022).....	13
Dim-ECOL o samplau wrin cymunedol (n = 17,441 yn 2022)	15
Dolenni defnyddiol:	17

Bydd fersiwn Gymraeg o'r graffiau yn dilyn cyn gynted â phosibl

Cyflwyniad

Yn 2014, cafodd Arglwydd O'Neill ei gomisiynu gan Brif Weinidog y DU i adolygu effaith fyd-eang ymwrthedd gwrthficrobaidd. Amcangyfrifodd erbyn 2050, y byddai 10 miliwn o fywydau bob blwyddyn a gwerth cronol o 100 triliwn o ddoleri'r UD o allbwn economaidd mewn perygl o ganlyniad i'r cynnydd mewn heintiau sy'n ymwrthod cyffuriau pe na ddaethpwyd o hyd i atebion rhagweithiol nawr er mwyn arafu'r cynnydd yn yr heintiau hynny.

Mewn ymateb i adroddiad ac argymhellion Arglwydd O'Neill, ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei gweledigaeth 20 mlynedd ar gyfer ymwrthedd gwrthficrobaidd, a'i chynllun gweithredu cenedlaethol pum mlynedd i fynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd. Y weledigaeth yw bod rhanddeiliaid ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang gyda'i gilydd yn atgyfnerthu polisïau ac arferion, yn gwella gwaith ymchwil a gwyliadwriaeth, ac yn datblygu trefniadau rheoleiddio effeithiol i gyfyngu ar ymwrthedd a'i reoli.

Mae ymwrthedd gwrthficrobaidd yn broblem gynyddol yng Nghymru ac mae eisoes wedi arwain at nifer bach o heintiau anodd i'w trin, gan arwain at achosion o therapi yn methu a chymhlethdodau posibl. Mae triniaethau ar gyfer y rhan fwyaf o heintiau yn dechrau mewn ffordd empirig cyn bod y rhagdueddiadau gwrthficrobaidd yn hysbys. Un broblem benodol pan fydd ymwrthedd gwrthficrobaidd yn lledaenu yw ei bod hi'n dod yn anos dewis therapi empirig a fydd yn gweithredu mewn modd dibynadwy.

Nod yr adroddiad hwn gan dîm HARP yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yw cyflwyno data gwyliadwriaeth y gellir eu defnyddio i ddylunio canllawiau therapi empirig, ac i olrhain tueddiadau ymwrthedd gwrthficrobaidd yng Nghymru.

Pwyntiau Allweddol o Ddiddordeb

Escherichia coli (yr achos mwyaf cyffredin o heintiau'r llwybr wrinol yng Nghymru)

- Mae ymwrthedd i co-amoxiclav wedi cynyddu'n sylweddol mewn *E. coli* o samplau wrin rhwng 2016 a 2021.
- Bu gostyngiad sylweddol yn y gyfradd ymwrthedd i trimethoprim mewn *E. coli* o samplau wrin rhwng 2016 a 2022; gallai hyn fod yn gysylltiedig â'r ffaith bod trimethoprim yn cael ei ddefnyddio llai i drin heintiau'r llwybr wrinol (UTI).
- Yn gyffredinol, mae ymwrthedd i fflworocwinolon a nitrofurantoin wedi gostwng ar draws y lleoliadau yng Nghymru.

Coliformau nad ydynt yn gysylltiedig ag *Escherichia coli* (dim-ECOL)

- Caiff data ar gyfer coliformau nad ydynt yn gysylltiedig ag *Escherichia coli* eu cyflwyno yn ail ran yr adroddiad hwn ac maent yn dangos newidiadau tebyg o ran tueddiadau ymwrthedd ar gyfer co-amoxiclav a trimethoprim ag *E. coli*.

Methodoleg

Data ar ymwrthedd

Ffynonellau Data

Daw'r data ar brofion rhagdueddiadau gwrthficrobaidd o system DataStore Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Grwpiau Gwrthficrobaidd

Yn 2012/2013, rhoddwyd methodoleg Pwyllgor Ewrop ar Brofion Rhagdueddiadau Gwrthficrobaidd (EUCAST) ar gyfer profion rhagdueddiadau gwrthficrobaidd (AST) ar waith yn yr holl labordai yng Nghymru (https://eucast.org/clinical_breakpoints).

Organebau


Mae'r organebau wrinol wedi'u rhannu'n ddau grŵp yn yr adroddiad hwn, sef (1) *Escherichia coli* a (2) dim-ECOL. Roedd y grŵp dim-ECOL yn cynnwys:

- *Citrobacter* spp.
- Coliform
- *Cronobacter* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Escherichia* spp.
- *Hafnia* spp.
- *Klebsiella* spp.
- *Kluyvera* spp.
- *Leclercia* spp.
- *Morganella* spp.
- *Pantoea* spp.
- *Proteus* spp.
- *Providencia* spp.
- *Rahnella* spp.
- *Raoultella* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Serratia* spp.
- *Yersinia* spp.

Escherichia coli

E. coli o samplau wrin cleifion mewnol (n = 9,784 yn 2022)

Mae patrymau rhagduddiadau Cymru gyfan (**S/I/R**) ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cleifion mewnol yn 2022 i'w gweld yn **Ffigur 1**. Mae'r tueddiadau yn y cyfraddau ymwrthedd ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2022 i'w gweld yn **Ffigur 2**.




Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FOS = fosfomycin, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, NIT = nitrofurantoin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim

Ffigur 1: Patrymau rhagduddiadau Cymru gyfan ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cleifion mewnol (2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Roedd y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth, sef **13.1%** [12.5, 13.8] yn gymharol isel.
- Mae ymwrthedd i amoxicillin yn parhau'n uchel, sef **58.2%** [57.2, 59.2].
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **44.6%** [43.6, 45.5] i co-amoxiclav.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fflworocwinolon, sef **15.8%** [15.1, 16.6] yn gymharol isel.
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **37.5%** [36.5, 38.5] i trimethoprim.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fosfomycin, nitrofurantoin a pivmecillinam yn llai na **10%**.



Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FOS = fosfomycin, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, NIT = nitrofurantoin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim


Ffigur 2: Cyfraddau ymwrthedd gwrthficrobaidd Cymru gyfan ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cleifion mewnol (2016 i 2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Ni fu unrhyw newid sylweddol yn y gyfradd ymwrthedd ar gyfer ceffalosporinau trydedd genhedlaeth.
- Bu gostyngiad ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i amoxicillin rhwng 2016 a 2022, ond mae'r gyfradd ymwrthedd yn 2022, sef **58.2%**, yn parhau'n uchel.
- Bu cynnydd ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i co-amoxiclav rhwng 2016 a 2021, ond roedd yn sefydlog yn 2022 ar gyfradd o **44.6%**.
- Caiff y data ar gyfer fosfomycin a pivmecillinam ar gyfer 2016-2019 eu cyflwyno ar ffurf bariau rhesog yn y graff, sy'n dangos bod <80% o achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfryngau hyn. Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, ac yn nodi y dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r data.
- Ymddengys fod tuedd bach ar i lawr o ran cyfraddau ymwrthedd yn y grŵp fflworocwinolon a nitrofurantoin.
- Bu gostyngiad ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i trimethoprim rhwng 2016 a 2022, sydd fwy na thebyg yn gysylltiedig â newidiadau i'r canllawiau ar gyfer trin UTI.

E. coli o samplau wrin cleifion allanol (n = 3,808 yn 2022)

Mae patrymau rhagduddiadau Cymru gyfan (S/I/R) ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cleifion allanol yn 2022 i'w gweld yn **Ffigur 3**. Mae'r tuddiadau yn y cyfraddau ymwrthedd ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2022 i'w gweld yn **Ffigur 4**.




Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FOS = fosfomycin, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, NIT = nitrofurantoin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim

Ffigur 3: Patrymau rhagduddiadau Cymru gyfan ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cleifion allanol (2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Roedd y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth, sef **9.2%** [8.3, 10.1] yn gymharol isel.
- Mae ymwrthedd i amoxicillin yn parhau'n uchel, sef **51.7%** [50.1, 53.3].
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **38.8%** [37.2, 40.3] i co-amoxiclav.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fflworocwinolon, sef **13.4%** [12.4, 14.6] yn gymharol isel.
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **31.6%** [30.1, 33.1] i trimethoprim.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fosfomycin, nitrofurantoin a pivmecillinam yn llai na **5%**.




Ffigur 4: Cyfraddau ymwrthedd gwrthficrobaidd Cymru gyfan ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cleifion allanol (2016 i 2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Ni fu unrhyw newid sylweddol yn y gyfradd ymwrthedd ar gyfer ceffalosporinau trydedd genhedlaeth.
- Bu gostyngiad ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i amoxicillin rhwng 2016 a 2022, ond mae'r gyfradd ymwrthedd yn 2022, sef **51.7%**, yn parhau'n uchel.
- Bu cynnydd ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i co-amoxiclav rhwng 2016 a 2021, ond roedd yn sefydlog yn 2022 ar gyfradd o **38.8%**.
- Caiff y data ar gyfer amoxicillin, fosfomicin a pivmecillinam eu cyflwyno ar ffurf bariau rhesog yn y graff, sy'n dangos bod <80% o achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfryngau hyn. Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, ac yn nodi y dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r data.
- Ni fu unrhyw newid sylweddol yn y gyfradd ymwrthedd ar gyfer y grŵp fflworocwinolon a nitrofurantoin.
- Bu gostyngiad ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i trimethoprim rhwng 2016 a 2022, sydd fwy na thebyg yn gysylltiedig â newidiadau i'r canllawiau ar gyfer trin UTI.

E. coli o samplau wrin cymunedol (n = 58,407 yn 2022)


Mae patrymau rhagdueddiadau Cymru gyfan (**S/I/R**) ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cymunedol yn 2022 i'w gweld yn **Ffigur 5**. Mae'r tueddiadau yn y cyfraddau ymwrthedd ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2022 i'w gweld yn **Ffigur 6**.



Ffigur 5: Patrymau rhagdueddiadau Cymru gyfan ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cymunedol (2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Roedd y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth, sef **6.7%** [6.5, 6.9] yn gymharol isel.
- Caiff data ar gyfer amoxicillin eu cyflwyno ar ffurf bar rhesog sy'n awgrymu bod <80% o'r achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfrwng hwn: Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, a dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r data hyn.
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **34.5%** [34.1, 34.9] i co-amoxiclav.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fflworocwinolon, sef **8.1%** [7.9, 8.3] yn gymharol isel.
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **28.2%** [27.9, 28.6] i trimethoprim.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fosfomycin, nitrofurantoin a pivmecillinam yn llai na **5%**.



Ffigur 6: Cyfraddau ymwrthedd gwrthficrobaidd Cymru gyfan ar gyfer *E. coli* o samplau wrin cymunedol (2016 i 2022)


Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Ni fu unrhyw newid sylweddol yn y gyfradd ymwrthedd ar gyfer ceffalosporinau trydedd genhedlaeth.
- Bu cynnydd ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i co-amoxiclav rhwng 2016 a 2021, ond roedd yn sefydlog yn 2022 ar gyfradd o **34.5%**.
- Caiff y data ar gyfer amoxicillin, fosfomycin a pivmecillinam eu cyflwyno ar ffurf bariau rhesog yn y graff ar gyfer rhai blynyddoedd, sy'n dangos bod <80% o achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfryngau hyn. Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, ac yn nodi y dylid bod yn ofalus wrth dehongli'r data.
- Ymddengys fod tuedd bach ar i lawr o ran cyfraddau ymwrthedd yn y grŵp fflworocwinolon a nitrofurantoin.
- Bu gostyngiad ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i trimethoprim rhwng 2016 a 2022, sydd fwy na thebyg yn gysylltiedig â newidiadau i'r canllawiau ar gyfer trin UTI.

Coliformau nad ydynt yn gysylltiedig ag *Escherichia coli*

Dim-ECOL o samplau wrin cleifion mewnol (n = 5,438 yn 2022)

Mae patrymau rhagduddiadau **Cymru gyfan (S/I/R)** ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cleifion mewnol yn 2022 i'w gweld yn **Ffigur 10**. Mae'r tueddiadau yn y cyfraddau ymwrthedd ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2022 i'w gweld yn **Ffigur 11**.




Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim

Ffigur 10: Patrymau rhagduddiadau Cymru gyfan ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cleifion mewnol (2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Roedd cyfradd ymwrthedd o **17.7%** [16.7, 18.7] i geffalosporin trydedd genhedlaeth.
- Mae ymwrthedd i amoxicillin yn parhau'n uchel, sef **79.0%** [77.9, 80.1].
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **38.7%** [37.4, 40.0] i co-amoxiclav.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fflworocwinolon, sef **13.4%** [12.6, 14.4] yn gymharol isel.
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i pivmecillinam, sef **10.7%** [9.9, 11.6] yn gymharol isel.
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **42.1%** [40.8, 43.4] i trimethoprim.



Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim


Ffigur 11: Cyfraddau ymwrthedd gwrthficrobaidd Cymru gyfan ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cleifion mewnol (2016 i 2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Bu tuedd ar i fyny yn y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth i **17.7%** [16.7, 18.7] yn 2022.
- Mae ymwrthedd i amoxicillin yn parhau'n uchel yn 2022, sef **79.0%** [77.9, 80.1]
- Bu cynnydd ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i co-amoxiclav rhwng 2016 a 2020, ond roedd yn sefydlog yn 2022 ar gyfradd o **38.7%** [37.4, 40.0].
- Prin fu'r newid yn y cyfraddau ymwrthedd i fflworocwinolon rhwng 2019 a 2022.
- Caiff y data ar gyfer pivmecillinam ar gyfer 2016-2020 eu cyflwyno ar ffurf bariau rhesog yn y graff, sy'n dangos bod <80% o achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfrwng hwn. Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, ac yn nodi y dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r data.
- Ni fu unrhyw newid yn y gyfradd ymwrthedd i trimethoprim rhwng 2016 a 2022.

Dim-ECOL o samplau wrin cleifion allanol (n = 1,838 yn 2022)

Mae patrymau rhagduddiadau **Cymru gyfan (S/I/R)** ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cleifion allanol yn 2022 i'w gweld yn **Ffigur 12**. Mae'r tueddiadau yn y cyfraddau ymwrthedd ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2022 i'w gweld yn **Ffigur 13**.




Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim

Ffigur 12: Patrymau rhagduddiadau Cymru gyfan ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cleifion allanol (2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Roedd y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth, sef **12.6%** [11.1, 14.2] yn gymharol isel
- Mae ymwrthedd i amoxicillin yn parhau'n uchel, sef **83.5%** [81.7, 85.1]
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **34.0%** [31.9, 36.2] i co-amoxiclav
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fflworocwinolon, sef **8.5%** [7.3, 9.9] yn gymharol isel
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i pivmecillinam, sef **9.0%** [7.7, 10.4] yn gymharol isel
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **31.0%** [29.0, 33.2] i trimethoprim



Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim


Ffigur 13: Cyfraddau ymwrthedd gwrthficrobaidd Cymru gyfan ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cleifion allanol (2016 i 2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Bu tuedd ar i fyny yn y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth i **12.6%** yn 2022.
- Mae ymwrthedd i amoxicillin yn parhau'n uchel yn 2022, sef **83.5%**.
- Bu cynnydd ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i co-amoxiclav rhwng 2016 a 2020, ond roedd yn sefydlog yn 2022 ar gyfradd o **34.0%**.
- Prin fu'r newid yn y cyfraddau ymwrthedd i fflworocwinolon rhwng 2019 a 2022.
- Caiff y data ar gyfer amoxicillin a pivmecillinam ar gyfer 2016-2019 eu cyflwyno ar ffurf bariau rhesog yn y graff, sy'n dangos bod <80% o achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfrwng hwn. Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, ac yn nodi y dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r data.
- Ni fu unrhyw newid yn y gyfradd ymwrthedd i trimethoprim rhwng 2016 a 2022.

Dim-ECOL o samplau wrin cymunedol (n = 17,441 yn 2022)

Mae patrymau rhagduddiadau **Cymru gyfan (S/I/R)** ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cymunedol yn 2022 i'w gweld yn **Ffigur 14**. Mae'r tueddiadau yn y cyfraddau ymwrthedd ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2022 i'w gweld yn **Ffigur 15**.




Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim

Ffigur 14: Patrymau rhagduddiadau Cymru gyfan ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cymunedol (2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Roedd y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth, sef **7.8%** [7.4, 8.2] yn gymharol isel
- Caiff y data ar gyfer amoxicillin eu cyflwyno ar ffurf bar rhesog yn y graff, sy'n dangos bod <80% o achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfryngau hyn. Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, ac yn nodi y dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r data.
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **29.9%** [29.3, 30.6] i co-amoxiclav
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i fflworocwinolon, sef **5.8%** [5.4, 6.1] yn gymharol isel
- Roedd y gyfradd ymwrthedd i pivmecillinam, sef **7.8%** [7.4, 8.2] yn gymharol isel
- Roedd cyfradd ymwrthedd o **27.5%** [26.8, 28.2] i trimethoprim



Key: 3GC = resistance to ceftazidime &/or cefotaxime, ceftriaxone, cefpodoxime, AMO = amoxicillin, COA = co-amoxiclav, FQ = ciprofloxacin &/or levofloxacin, or norfloxacin, PIV = pivmecillinam, TRI = trimethoprim

Ffigur 15: Cyfraddau ymwrthedd gwrthficrobaidd Cymru gyfan ar gyfer Dim-ECOL o samplau wrin cymunedol (2016 i 2022)

Yr hyn y mae'r data yn ei ddangos

- Ni fu unrhyw newid sylweddol yn y gyfradd ymwrthedd i geffalosporin trydedd genhedlaeth rhwng 2016 a 2022.
- Caiff y data ar gyfer amoxicillin ar gyfer 2019-2022 a pivmecillinam ar gyfer 2016-2019 eu cyflwyno ar ffurf bariau rhesog yn y graff, sy'n dangos bod <2022% o achosion ynysig wedi cael eu profi yn erbyn y cyfryngau hyn. Mae hyn yn awgrymu dull profi dethol, ac yn nodi y dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r data.
- Bu cynnydd ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i co-amoxiclav rhwng 2016 a 2020, ond roedd yn sefydlog yn 2022 ar gyfradd o **29.9%**.
- Prin fu'r newid yn y cyfraddau ymwrthedd i fflworocwinolon rhwng 2018 a 2022.
- Bu gostyngiad ystadegol arwyddocaol yn y gyfradd ymwrthedd i trimethoprim rhwng 2016 a 2022, sydd fwy na thebyg yn gysylltiedig â newidiadau i'r canllawiau ar gyfer trin UTI.

Dolenni defnyddiol:

Adolygiad o Ymwrthedd Gwrthficrobaidd, Mai 2016

<https://amr-review.org/>

Strategaeth Ymwrthedd Gwrthficrobaidd y DU 2013-18

<https://www.gov.uk/government/publications/uk-5-year-antimicrobial-resistance-strategy-2013-to-2018>

Cynllun Cyflenwi Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (Cymru) Law yn Llaw at Iechyd: Tactlo ymwrthedd gwrthficrobaidd a gwella rhagnodi gwrthfictigau.

<http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/888/Antimicrobial%20Resistance%20Delivery%20Plan.pdf>

Gweledigaeth 20 mlynedd y DU ar gyfer ymwrthedd gwrthficrobaidd

<https://www.gov.uk/government/publications/uk-20-year-vision-for-antimicrobial-resistance>

Ymwrthedd gwrthficrobaidd: Y DU yn lansio cynllun gweithredu 5 mlynedd a gweledigaeth

20 mlynedd <https://www.gov.uk/government/news/antimicrobial-resistance-uk-launches-5-year-action-plan-and-20-year-vision>



https://eucastrg/clinical_breakpoints