



Cymorth penderfynu ar gyfer amheuaeth o haint y llwybr wrinol (UTI) mewn pobl hŷn ac eiddil (Cartrefi Gofal Hirdymor)

Defnyddio symptomau/arwyddion i arwain rheolaeth. Ni chaiff ffyn trochi wrin eu hargymell mwyach yn y diagnosis o UTI mewn pobl >65 oed. Anfon meithriniadau wrin ar gyfer cleifion SYMPTOMATIG

Gwiriwch am unrhyw symptomau/arwyddion

- Symptomau neu arwyddion lleol o UTI e.e. dyswria newydd; anymataliaeth; brys
- Tymheredd 38°C neu uwch; 36°C neu is; 1.5°C yn uwch na'r arfer ddwywaith yn ystod y 12 awr ddiwethaf
- Arwyddion amheuaeth o haint: e.e. mwy o ddryswch; galli rheolaeth ddiabetaidd

Nac

[Rheolaeth ataliol](#)
TARGED
Tafleenni

Oes

A oes gan y claf/preswilydd gathetr wrinol?

Oes

Nac oes

A oes gan y claf/preswilydd un neu fwy o'r arwyddion neu'r symptomau canlynol?

- Crynu oerfel (crynodod)
- Poen costofertebrol newydd / tynerwch (ardal o'r cefn dros yr aren)
- Deliriwm newydd neu deliriwm sy'n bodoli eisoes yn gwaethgu (dryswch)

Nac oes

Oes

UTI yn annhebygol ond yn parhau i fonitro tymheredd, pwls, cyfradd resbiradol a Phwysedd Gwaed am 72 awr.

Twymyn barhaus a datblygu un neu fwy o'r symptomau uchod?

Oes

UTI posibl

Twymyn barhaus a datblygu un neu fwy o'r symptomau uchod?

Oes

Oes

Nac oes

- A oes gan y claf/preswilydd
- Dyswria newydd (poen wrth basio dŵr) yn unig
- NEU ddau neu fwy o arwyddion neu symptomau newydd?
- Angen brys i basio dŵr
- Angen aml i basio dŵr
- Anymataliaeth wrinol newydd neu waethgu
- Crynu oerfel (crynodod)
- Poen yn yr ystlys (ochr y corff) neu uwchbwbig (uwchben yr asgwrn pwbig)
- Hematwria diamau (gwaed gweladwy mewn)

UTI yn annhebygol ond yn parhau i fonitro tymheredd, pwls, cyfradd resbiradol a BP am 72 awr
Cysylltwch â'r clinigwr ar unwaith os yw'n glaf

- Cysylltwch â Staff Meddygol/Clinigol i ofyn am adolygiad o'r claf/preswilydd
- Cael sampl o wrin a'i anfon at Ficrobioleg - cynnwys manylion clinigol a thriniaeth arfaethedig/presennol ar y ffurflen
- Aseswch a yw'n debygol y caiff wrin ei gadw - cathetr wedi'i rwystro neu bledren chwyddedig
- Os rhoddir gwrthfotigau ar bresgripsiwn iddynt, dylid dechrau triniaeth yn unol â chanllawiau gwrthficrobaidd.
- OS OES GAN Y CLAF/PRESWYLYDD GATHETR WRINOL, TYNNWCH EF A'I NEWID - Yn ddelfrydol ar ôl dechrau gwrthfotigau neu heb fawr o oedi i DDECHRAU GWRTHBIOTEG.
- Ystyried yr angen parhaus am gathetr hirdymor mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr
- Sicrhau hydradiad digonol
- Ystyried defnyddio analgesia i leddfu poen
- Ystyried cynyddu gofal os oes gan y claf/preswilydd dwymyn ag oerfel neu isbwysedd newydd (Pwysedd Gwaed isel)
- Adolygu'r ymateb i driniaeth yn ddyddiol ac os nad oes gwelliant mewn symptomau neu ddirywiad, ystyriwch lefel uwch o ofal