

Ar ol eich Sgrinio Llygad Diabetig



Gall hylif llygaid Tropicamide 1% achosi adwaith yn y llygaid neu o'u cwmpas.

Os ydych yn profi unrhyw rai o'r symptomau hyn ar ôl y sgrinio, dylech weld eich optometrydd ar unwaith neu ewch i adran achosion brys mewn ysbyty yn eich ardal chi.

After your Diabetic Eye Screening



Tropicamide 1% eye drops can cause a reaction in or around your eyes.

If you experience any of these symptoms after screening, you should see your optometrist immediately or go to a hospital emergency department near you.

Y symptomau yw:

- poen, anesmwythder, chwyddo neu gosi yn eich llygaid neu o'u cwmpas;
- cochni yn narnau gwyn eich llygaid;
- golwg gymylog sy'n gwaethygu neu sy'n barhaus ychydig oriau ar ôl i chi gael eich sgrinio (mae'n bosibl y byddwch hefyd yn gweld cylchoedd o liwiau'r enfys o gwmpas goleuadau);
- cyfogi neu daflu i fyny.

The symptoms are:

- pain, discomfort, swelling or itching in or around your eyes;
- redness in the whites of your eyes;
- worsening or persistent blurred vision a few hours after being screened (you may also see rainbow halos around lights); and
- nausea or vomiting.